

## Um estudo relata que uma dose diária de antibiótico comumente usado pode prevenir algumas infecções por sífilis, gonorreia e clamídia

Os cientistas relataram **bet35** uma sexta-feira que uma dose diária de um antibiótico amplamente usado pode prevenir algumas infecções por sífilis, gonorreia e clamídia, potencialmente uma nova solução para a crise escalonada de infecções sexualmente transmissíveis.

O estudo foi pequeno e deve ser confirmado por mais pesquisas. Os cientistas ainda têm que resolver questões significativas, incluindo se as ISTs poderiam se tornar resistentes ao antibiótico e qual poderia ser o efeito sobre as bactérias saudáveis do trato digestivo **bet35** pessoas que o tomam todos os dias.

### Recomendação principalmente para pessoas **bet35** risco elevado

A abordagem seria recomendada principalmente para pessoas **bet35** risco elevado de infecções sexualmente transmissíveis **bet35** determinados períodos, disse o Dr. Jeffrey Klausner, um fisiologista de doenças infecciosas da Universidade do Sul da Califórnia que não participou do novo trabalho.

"O número de pessoas que realmente vão ser oferecidas essa e tomá-la ainda é muito pequeno", disse ele. "Em geral, quantas mais opções de prevenção tivermos para as pessoas, melhor."

### Resultados serão apresentados na próxima semana

Os resultados serão apresentados na próxima semana **bet35** uma conferência da Sociedade Internacional de AIDS **bet35** Munique.

Os Estados Unidos agora têm a maior taxa de novas infecções por sífilis desde 1950, relatou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças **bet35** janeiro. Em 2024, o último ano para o qual há dados disponíveis, houve 1,6 milhão de casos de clamídia e quase 650.000 novos casos de gonorreia.

### Recomendação do CDC

Estudos anteriores mostraram que o antibiótico doxiciclina reduz significativamente o risco de novas infecções se tomado dentro de 72 horas após o sexo não protegido. A CDC agora recomenda tomar doxiciclina após "sexo oral, vaginal ou anal".

A recomendação se aplica apenas a homens gays e bissexuais e mulheres transgêneras que tiveram uma IST no último ano ou que possam estar **bet35** risco de uma. Não há evidências suficientes de que a estratégia, chamada doxy-PEP, funciona para outros grupos, concluiu a agência.

### Nova abordagem

O novo estudo adotou uma abordagem diferente, examinando a prevenção de ISTs com uma dose diária da droga, o que pode ser melhor para indivíduos com exposição frequente à infecção. Alguns provedores sugeriram que os pacientes podem se recusar a tomar antibióticos todos os dias. Mas muitos pacientes disseram aos pesquisadores que seria mais fácil para eles lembrar de tomar uma dose diária ao lado de uma dose diária para a prevenção ou tratamento da

prevenção do HIV, disse o Dr. Troy Grennan, que lidera o programa de HIV no BC Center for Disease Control **bet35** Vancouver.

O diretor de  
Spartaco  
e.

---

**Informações do documento:**

Autor: symphonyinn.com

Assunto: bet35

Palavras-chave: **bet35 - symphonyinn.com**

Data de lançamento de: 2024-07-21