

## Minorías étnicas y jóvenes necesitan más visitas al GP antes de ser diagnosticados con cáncer

Un análisis reciente indica que las minorías étnicas y las personas jóvenes requieren más visitas al médico de cabecera (GP) antes de ser diagnosticadas con cáncer, en comparación con otras personas.

De media, una de cada cinco personas en Inglaterra necesita tres o más interacciones con el GP antes de ser diagnosticadas con cáncer. Sin embargo, para las personas de background étnico, este porcentaje aumenta a una de cada tres, según el análisis de la encuesta de experiencia del paciente de cáncer del NHS del 2024 por QualityWatch, un programa joint de la Nuffield Trust y la Health Foundation.

Para las personas jóvenes de entre 16 y 24 años, aproximadamente la mitad necesitó al menos tres visitas al GP antes de ser diagnosticadas, con un 20% necesitando al menos cinco visitas. A pesar de esto, los jóvenes todavía tenían más probabilidades de ser diagnosticados en una etapa temprana de su cáncer.

### Mayores desigualdades en el cuidado del cáncer

El análisis también encontró que las personas de las zonas más desfavorecidas de Inglaterra tenían un 21% menos de probabilidades de ser remitidas para una sospecha de cáncer urgente que las de zonas más acomodadas.

La propia meta del NHS es tener tres cuartas partes de los cánceres diagnosticados en una etapa temprana para el 2028.

La investigación también revela las desigualdades en el cuidado del cáncer entre demográficos en Inglaterra. La privación ya causa unas 33.000 muertes adicionales por cáncer en el Reino Unido, mientras que las personas negras y asiáticas, en promedio, esperan más tiempo para un diagnóstico de cáncer que sus contrapartes blancas.

### Retos en la identificación de síntomas de cáncer en jóvenes

La profesora Kamila Hawthorne, presidenta del Real Colegio de Médicos de Atención Primaria, dijo que identificar los síntomas de cáncer en jóvenes podría ser desafiante, ya que el riesgo para el grupo en general es mucho menor.

Hawthorne dijo: "Garantizar que los pacientes reciban referencias oportunas y adecuadas para sospechas de cáncer es una prioridad para los médicos de cabecera - y en este sentido, están haciendo un buen trabajo, realizando más referencias urgentes y garantizando que más cánceres se diagnostiquen en una etapa temprana que nunca.

"Aunque los médicos de cabecera están altamente calificados para identificar cánceres, esto sigue siendo desafiante en la atención primaria, especialmente y particularmente con algunos cánceres, debido a que los síntomas son a menudo vagos y típicos de otras condiciones más comunes."

---

## Partilha de casos

# Minorías étnicas y jóvenes necesitan más visitas al GP antes de ser diagnosticados con cáncer

Un análisis reciente indica que las minorías étnicas y las personas jóvenes requieren más visitas al médico de cabecera (GP) antes de ser diagnosticadas con cáncer, en comparación con otras personas.

De media, una de cada cinco personas en Inglaterra necesita tres o más interacciones con el GP antes de ser diagnosticadas con cáncer. Sin embargo, para las personas de background étnico, este porcentaje aumenta a una de cada tres, según el análisis de la encuesta de experiencia del paciente de cáncer del NHS del 2024 por QualityWatch, un programa joint de la Nuffield Trust y la Health Foundation.

Para las personas jóvenes de entre 16 y 24 años, aproximadamente la mitad necesitó al menos tres visitas al GP antes de ser diagnosticadas, con un 20% necesitando al menos cinco visitas. A pesar de esto, los jóvenes todavía tenían más probabilidades de ser diagnosticados en una etapa temprana de su cáncer.

## Mayores desigualdades en el cuidado del cáncer

El análisis también encontró que las personas de las zonas más desfavorecidas de Inglaterra tenían un 21% menos de probabilidades de ser remitidas para una sospecha de cáncer urgente que las de zonas más acomodadas.

La propia meta del NHS es tener tres cuartas partes de los cánceres diagnosticados en una etapa temprana para el 2028.

La investigación también revela las desigualdades en el cuidado del cáncer entre demográficos en Inglaterra. La privación ya causa unas 33.000 muertes adicionales por cáncer en el Reino Unido, mientras que las personas negras y asiáticas, en promedio, esperan más tiempo para un diagnóstico de cáncer que sus contrapartes blancas.

## Retos en la identificación de síntomas de cáncer en jóvenes

La profesora Kamila Hawthorne, presidenta del Real Colegio de Médicos de Atención Primaria, dijo que identificar los síntomas de cáncer en jóvenes podría ser desafiante, ya que el riesgo para el grupo en general es mucho menor.

Hawthorne dijo: "Garantizar que los pacientes reciban referencias oportunas y adecuadas para sospechas de cáncer es una prioridad para los médicos de cabecera - y en este sentido, están haciendo un buen trabajo, realizando más referencias urgentes y garantizando que más cánceres se diagnostiquen en una etapa temprana que nunca.

"Aunque los médicos de cabecera están altamente calificados para identificar cánceres, esto sigue siendo desafiante en la atención primaria, especialmente y particularmente con algunos cánceres, debido a que los síntomas son a menudo vagos y típicos de otras condiciones más comunes."

---

## Expandir pontos de conhecimento

# Minorías étnicas y jóvenes necesitan más visitas al GP antes de ser diagnosticados con cáncer

Un análisis reciente indica que las minorías étnicas y las personas jóvenes requieren más visitas al médico de cabecera (GP) antes de ser diagnosticadas con cáncer, en comparación con otras

personas.

De media, una de cada cinco personas en Inglaterra necesita tres o más interacciones con el GP antes de ser diagnosticadas con cáncer. Sin embargo, para las personas de background étnico, este porcentaje aumenta a una de cada tres, según el análisis de la encuesta de experiencia del paciente de cáncer del NHS del 2024 por QualityWatch, un programa joint de la Nuffield Trust y la Health Foundation.

Para las personas jóvenes de entre 16 y 24 años, aproximadamente la mitad necesitó al menos tres visitas al GP antes de ser diagnosticadas, con un 20% necesitando al menos cinco visitas. A pesar de esto, los jóvenes todavía tenían más probabilidades de ser diagnosticados en una etapa temprana de su cáncer.

## **Mayores desigualdades en el cuidado del cáncer**

El análisis también encontró que las personas de las zonas más desfavorecidas de Inglaterra tenían un 21% menos de probabilidades de ser remitidas para una sospecha de cáncer urgente que las de zonas más acomodadas.

La propia meta del NHS es tener tres cuartas partes de los cánceres diagnosticados en una etapa temprana para el 2028.

La investigación también revela las desigualdades en el cuidado del cáncer entre demográficos en Inglaterra. La privación ya causa unas 33.000 muertes adicionales por cáncer en el Reino Unido, mientras que las personas negras y asiáticas, en promedio, esperan más tiempo para un diagnóstico de cáncer que sus contrapartes blancas.

## **Retos en la identificación de síntomas de cáncer en jóvenes**

La profesora Kamila Hawthorne, presidenta del Real Colegio de Médicos de Atención Primaria, dijo que identificar los síntomas de cáncer en jóvenes podría ser desafiante, ya que el riesgo para el grupo en general es mucho menor.

Hawthorne dijo: "Garantizar que los pacientes reciban referencias oportunas y adecuadas para sospechas de cáncer es una prioridad para los médicos de cabecera - y en este sentido, están haciendo un buen trabajo, realizando más referencias urgentes y garantizando que más cánceres se diagnostiquen en una etapa temprana que nunca.

"Aunque los médicos de cabecera están altamente calificados para identificar cánceres, esto sigue siendo desafiante en la atención primaria, especialmente y particularmente con algunos cánceres, debido a que los síntomas son a menudo vagos y típicos de otras condiciones más comunes."

---

## **comentário do comentarista**

## **Minorías étnicas y jóvenes necesitan más visitas al GP antes de ser diagnosticados con cáncer**

Un análisis reciente indica que las minorías étnicas y las personas jóvenes requieren más visitas al médico de cabecera (GP) antes de ser diagnosticadas con cáncer, en comparación con otras personas.

De media, una de cada cinco personas en Inglaterra necesita tres o más interacciones con el GP antes de ser diagnosticadas con cáncer. Sin embargo, para las personas de background étnico, este porcentaje aumenta a una de cada tres, según el análisis de la encuesta de experiencia del paciente de cáncer del NHS del 2024 por QualityWatch, un programa joint de la Nuffield Trust y la Health Foundation.

Para las personas jóvenes de entre 16 y 24 años, aproximadamente la mitad necesitó al menos tres visitas al GP antes de ser diagnosticadas, con un 20% necesitando al menos cinco visitas. A pesar de esto, los jóvenes todavía tenían más probabilidades de ser diagnosticados en una etapa temprana de su cáncer.

## Mayores desigualdades en el cuidado del cáncer

El análisis también encontró que las personas de las zonas más desfavorecidas de Inglaterra tenían un 21% menos de probabilidades de ser remitidas para una sospecha de cáncer urgente que las de zonas más acomodadas.

La propia meta del NHS es tener tres cuartas partes de los cánceres diagnosticados en una etapa temprana para el 2028.

La investigación también revela las desigualdades en el cuidado del cáncer entre demográficos en Inglaterra. La privación ya causa unas 33.000 muertes adicionales por cáncer en el Reino Unido, mientras que las personas negras y asiáticas, en promedio, esperan más tiempo para un diagnóstico de cáncer que sus contrapartes blancas.

## Retos en la identificación de síntomas de cáncer en jóvenes

La profesora Kamila Hawthorne, presidenta del Real Colegio de Médicos de Atención Primaria, dijo que identificar los síntomas de cáncer en jóvenes podría ser desafiante, ya que el riesgo para el grupo en general es mucho menor.

Hawthorne dijo: "Garantizar que los pacientes reciban referencias oportunas y adecuadas para sospechas de cáncer es una prioridad para los médicos de cabecera - y en este sentido, están haciendo un buen trabajo, realizando más referencias urgentes y garantizando que más cánceres se diagnostiquen en una etapa temprana que nunca.

"Aunque los médicos de cabecera están altamente calificados para identificar cánceres, esto sigue siendo desafiante en la atención primaria, especialmente y particularmente con algunos cánceres, debido a que los síntomas son a menudo vagos y típicos de otras condiciones más comunes."

---

### Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: {k0}

Palavras-chave: {k0} ~ site de apostas esportivas

Data de lançamento de: 2024-10-08

---

### Referências Bibliográficas:

- [nome do jogador que faz a propaganda do sportingbet](#)
- [7games meu dispositivo apk](#)
- [betano partners](#)
- [como funciona o bônus da sportingbet](#)